

# **Analiza**

**postępowania diagnostyczno –  
terapeutycznego u chorych na wybrane  
nowotwory złośliwe w aspekcie  
systemu opieki zdrowotnej  
na przykładzie województw:  
opolskiego, lubelskiego i  
świętokrzyskiego  
2008 – 2009 rok**


*Krzysztof Kuszewski*

- **Celem badania było określenie przyczyn powodujących niższy niż w innych krajach odsetek przeżyć 5-cio letnich w większości nowotworów złośliwych oraz wskazanie barier i czynników wpływających na efekt leczenia nowotworów. Celem była również ocena dostępności pacjenta do diagnostyki i leczenia oraz określenie czynników wpływających na opóźnienia w tej dziedzinie.**

- **O ile zachorowania, zarówno wśród kobiet i mężczyzn utrzymują się na dość niskim poziomie, to śmiertelność w Polsce z powodu tego rodzaju nowotworu złośliwego jest dość wysoka. W przypadku kobiet jest to 17,4/100,000 w danym roku, zajmując tym samym 8 miejsce wśród 27 krajów UE, dla mężczyzn 31,5/100,000 i 5 miejsce z powodu zgonów na nowotwór jelita grubego wśród krajów członkowskich UE**

- Jedną z głównych przyczyn tych niepokojących danych jest późna wykrywalność choroby nowotworowej i związana z tym niska skuteczność jej leczenia. Natomiast mocną stroną polskiej onkologii jest rozwinięta sieć ośrodków onkologicznych o wysokim poziomie referencyjności.
- Duże znaczenie na podjęcie szybkiej diagnostyki i skutecznego leczenia chorego ma wciąż niska świadomość polskiego społeczeństwa na temat objawów towarzyszących i przyczyn wystąpienia nowotworów

# Poddawanie się badaniom profilaktycznym.



- Biorąc pod uwagę wyniki badania ankietowego, należy stwierdzić, że średni czas od wystąpienia pierwszych niepokojących objawów raka jelita grubego do ustalenia ostatecznego rozpoznania **wynosił 195 dni.**
- Biorąc pod uwagę wyniki badania ankietowego, stwierdza się, że średni czas od wystąpienia pierwszych niepokojących objawów raka krtani do ustalenia ostatecznego rozpoznania **wynosił 121 dni.**
-

# WNIOSKI

- 
- **Rozpoczęcie diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych, na podstawie pilotażowego badania w zakresie nowotworów jelita grubego i krtani, jest w Polsce znacznie opóźnione o czym świadczy dobitnie rozpoczynanie w wielu przypadkach od leczenia paliatywnego. Przyczyny tego stanu są złożone i wynikają z:**
  - niskiej świadomości zdrowotnej społeczeństwa;
  - **braku skutecznych badań profilaktycznych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej;**
  - utrudnieniu drogi do kompetentnego leczenia, co łącznie powoduje wydłużenie czasu od pierwszych objawów do diagnozy w przypadku raka jelita grubego do ponad 190 dni, zaś raka krtani do 121 dni.

# Wnioski cd

- Skutecznym rozwiązaniem tych problemów może być:
- objęcie aktywną opieką profilaktyczną osób, które wybrały swojego lekarza rodzinnego, za co należy ustanowić opłaty „fee for service”;
- systematyczne kształcenie podyplomowe lekarzy i pielęgniarek w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych;
- umożliwienie konsultacji lekarzy pierwszego kontaktu i innych specjalności, w zakresie problemów onkologicznych poprzez wyznaczenie w każdym województwie, odpowiednich poradni konsultacyjnych.



# TAK BYŁO 5 LAT TEMU

