



Borelioza z Lyme

SPRAWDŹ, CZY DOTYCZY TO CIEBIE!

KTO JEST NAJBARDZIEJ NARAŻONY NA UKŁUCIE PRZEZ KLESZCZA?

- ▶ osoby spędzające czas w parkach, lasach, na łąkach
- ▶ uczestnicy wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych
- ▶ osoby uprawiające hobby na świeżym powietrzu: ogrodnicy, grzybiarze, wędkarze, myśliwi
- ▶ pracownicy leśni
- ▶ rolnicy
- ▶ żołnierze
- ▶ spacerowicze

Jeżeli ostatnio spędzałeś **czas na świeżym powietrzu, znalazłeś na ciele kleszcza lub zostałeś przez niego ukłuty**, sprawdź, czy nie jesteś zakażony! **Nie wykluczaj zakażenia boreliozą!**

KIEDY NAJCZĘŚCIEJ DOCHODZI DO ZAKAŻEŃ?

Do zakażenia człowieka dochodzi podczas ukłucia, kiedy następuje bezpośrednie wprowadzenie patogenów do organizmu człowieka. Większość przypadków zachorowań zdarza się wiosną, w okresie letnim i wczesnojesiennym, ponieważ w tym okresie kleszcze są najbardziej aktywne.

JAK WYGLĄDAJĄ OBJAWY KLINICZNE BORELIOZY Z LYME?

STADIUM Wczesne

- Rumień wędrujący
- Chłoniak limfocytarny skóry
- Neuroborelioza (zakażenie układu nerwowego)
- Zapalenie stawów
- Zapalenie mięśnia sercowego

STADIUM Późne

- Neuroborelioza
- Zapalenie stawów
- Przewlekłe zanikowe zapalenie skóry (ACA)

Borelioza we wczesnej fazie zakażenia może być bezobjawowa lub skąpo objawowa, co utrudnia jej wykrycie. Jeśli zaobserwowałeś u siebie powyższe objawy wejdź na stronę odkleszczowe.pzh.gov.pl i sprawdź, w którym punkcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) możesz wykonać bezpłatne badania.

Z boreliozą można wygrać!

KIEDY NALEŻY WYKONAĆ BADANIE?


PRZECIWCIAŁA KLASY IgM

- pojawiają się po 3 - 4 tyg. od zakażenia
- mogą utrzymywać się w surowicy przez lata
- wczesna faza boreliozy z Lyme

PRZECIWCIAŁA KLASY IgG

- pojawiają się po 4 - 6 tyg. od zakażenia
- mogą utrzymywać się w surowicy przez lata
- późna faza boreliozy z Lyme

JAK WYGLĄDA BADANIE?



LISTA PLACÓWEK udzielających świadczeń
na stronie odkleszczowe.pzh.gov.pl

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA:

